ZWEI NEUE ARTEN

DER

MELOLONTHIDEN-GATTUNG EUPHORESIA

VON

J. MOSER.

Euphoresia Schoutedeni n. sp.

Capite, clypeo brunneo, nitido, fortiter punctato, punctis setosis, fronte viridi, opaca, medio sparsim, juxta oculos dense flavo-squamosa; prothorace olivaceo, opaco, linea media longitudinali excepta, sparsim flavo-squamoso, utrinque vitta arcuata margineque laterali densius squamosis; scutello lateraliter squamulato; elytris fuscis, subnitidis, costatis, costis alternis latioribus, subinterruptis, raris squamis flavidis ornatis, interstitiis flavo-squamoso-setosis; pygidio nigro an fusco, opaco vitta longitudinali antemediana exepta, mediocriter dense squamis flavidis vestito. Subtus fusca, subnitida, mediocriter crebre flavo-squamosa et sparsim setosa. — Long. 11 mill.

Hab. : Congo belge (Kasai : Kondué). E. Luja leg.

Eine an der Skulptur und Beschuppung der Flügeldecken leicht erkenntliche Art. Der Clypeus ist braun, glänzend, kräftig, punktiert, die Punkte sind abstehend beborstet, diejenigen vor der Stirnnaht sind gelblich beschuppt. Die Stirn ist grün, matt, in der Mitte weitläufig mit gelben Schuppen besetzt, während dieselben neben den Augen einen dichten Kranz bilden. Das Halsschild ist

olivengrün, matt, weitläufig mit gelben Schuppen bedeckt, die eine unbeschuppte Mittellinie frei lassen. Durch engere Schuppenstellung bildet sich eine schmale Seitenrandbinde, sowie eine bogenförmige Binde neben dem Seitenrande. Letzterer trägt einige abstehende Borsten. Das Schildchen ist mit Ausnahme einer mittleren Längsbinde gelb beschuppt. Die Flügeldecken sind braun und schwach glänzend. Sie sind gerippt und sind die Rippen abwechselnd breiter und schmäler. Die Zwischenräume sind mit gelben Borstenschuppen bedeckt und werden die breiteren Rippen durch ebensolche Schuppen mehrere Male verschmälert oder fast unterbrochen. Die breiteren Rippen tragen ausserdem vereinzelte grössere gelbliche Schuppen. Das matte Pygidium ist schwarz oder braun und mit Ausnahme einer mittleren vom Vorderrand bis zur Mitte reichenden Längsbinde mässig dicht mit gelben schuppenartigen Borsten bedeckt. Die braune Unterseite ist schwach glänzend, auf der Mitte der Brust weitläufig, auf dem Abdomen dichter gelblich beschuppt und bilden die Schuppen zuweilen in den Hinterecken der Bauchsegmente kleine dicht beschuppte Flecke. Die Beine sind gleichfalls braun und mit beschuppten Punkten besetzt.

Euphoresia albosparsa n. sp.

Supra obscure olivacea, opaca, subtus brunnea, nitida, clypeo brunneo, nitido, fortiter punctato, punctis setosis, ante clypei suturam albo-squamosis; fronte juxta oculos squamosa; prothorace raris squamis albis tecto; scutello, linea media excepta, punctato; elytris costatis, squamis albis parvis majoribusque irregulariter vestitis; pygidio mediocriter dense squamoso, squamarum magnitudine variante. Subtus pectoris medio sparsim, abdomine densius albo-squamosa. — Long. 12 mill.

Hab. : Congo belge (Kasai : Kondué). E. Luja leg.

Die Oberseite ist, mit Ausnahme des braunen glänzenden Clypeus, schmutzig olivengrün, matt. Der Clypeus ist kräftig punktiert, die Punkte tragen im vorderen Teile abstehende Borsten, vor der Clypeusnaht weisse Schuppen. Die Stirn zeigt ausser einem Kranz von weissen Schuppen neben den Augen nur noch einige vereinzelte Schuppen. Auch das Halsschild ist sehr spärlich mit

weissen Schuppen besetzt, welche in der Mitte fast ganz fehlen. Das Schildchen ist mit Ausnahme einer Mittellinie punktiert und unbeschuppt. Die Flügeldecken sind gleichmässig gerippt und weiss gesprenkelt. Diese Sprenkel bestehen aus grösseren und kleineren Schuppen. Das Pygidium ist mässig dicht mit Schuppen von verschiedener Grösse bedeckt. Die Unterseite ist braun und schwach glänzend. Auf der Mitte der Brust stehen die Schuppen ziemlich weitläufig, auf dem Abdomen enger. Die Mitte der Brust trägt ausserdem einige abstehende Borsten und jedes Abdominalsegment ist mit einer Querreihe von Borsten besetzt. Die Schenkel sind weitläufig punktiert und mit kleinen schuppenartigen Borsten versehen. Die Hinterschenkel zeigen eine Quernaht langer abstehender Borsten.